


Mit dem Geoportal Baden-Württemberg arbeiten

Geoportal Baden-Württemberg: <https://www.geoportal-bw.de/>


Tutorial zur Bedienung




Thematische Karten laden

Hier am Beispiel der geologischen Karten 1:300 000 (GK 300) und 1:50 000 (GK 50).

Kartenauswahl öffnen




Thema der Karte auswählen und vorhandene Karten sichten




Karte durch Anklicken laden

Die Schritte 4 und 5 sind Alternativen, die beiden Karten sollten **nicht gleichzeitig** geladen werden.



Legende aufrufen



- Die jeweiligen Karten sind nur dann sichtbar, wenn der entsprechende Maßstab eingestellt ist.
- Die Legende ist eine sehr große Bilddatei, die u.U. nicht im Fenster der Legende angezeigt wird. Daher steht sie hier unten als Kopie.

Legende GK 300



	Moorbildung (qht)
	Hochwassersediment (meist auf Flussschotter; lokal andere Talfüllungen) (fh)
	Junger Süßwasserkalk (qk)
	Stuttgart-Travertin (qkS)
	Hangschutt (lokal Rutschmassen und andere Umlagerungssedimente) (qu)
	Flugsandsediment (lokal Hochflutsand) (fss)
	Lösssediment (lokal Abschwemmungen) (los)
	Lösssediment (lokal Schwemmsediment) auf Würm-Schotter (los/Wg)
	Würm-Schotter (Wg)
	Würm-Moränensediment (Wm)
	Riß-Beckensediment (Rb)
	Riß-Schotter (Rg)
	Riß-Moränensediment (Rm)
	Goldshöfe-Sand (GO)
	xc3x84lterer Flussschotter (ga)
	Mindel-Deckenschotter (Mg)
	Mindel-Moränensediment (Mm)
	Haslach-Deckenschotter (Hg)
	Günz-Deckenschotter (Gg)
	Donau-Deckenschotter (lokal auf Biber-Deckenschotter) (Dg)
	Umlagerungssediment mit Feuersteinen (lokal Feuersteinlehm) (umF)
	Pliozän-Schichten, ungliedert (tpl)
	Jungtertiäre Höhenschotter (Urdonau, Urkander) (tH)
	Jungtertiäres Seesediment (tS)
	Urbrenz-Sand (BR)
	Tüllingen-Formation (tTL)
	Miozän-Schichten, ungliedert (tmi)
	Oligozän-Schichten, ungliedert (tol)
	Eozän-Schichten, ungliedert (teo)
	Bohrerz-Formation (tBO)
	Bunte Trümmersmassen (XT)
	Ries-Suevit (XS)
	Obere Süßwassermolasse (tOS)
	Konglomeratische OSM (KGO)
	Jüngere Juranagelfluh (JZ)
	OSM-Süßwasserkalke (SKO)
	Brackwassermolasse (tBM)
	Obere Meeresmolasse (tOM)
	Untere Süßwassermolasse (tUS)
	Basalt und Basaltuff (im weiteren Sinn) (Ba-Bt)
	Deckentuff (Dt)
	Karbonatit (K)
	Phonolith (Ph)
	Essexit (E)
	Limbürgit (L')
	Tephrit (T)
	Massenkalk-Formation (joM)
	Liegende Bankkalk-, Zementmergel- und Hangende Bankkalk-Formation (ki4-ti1)
	Lacunosamergel-, Untere und Obere Felsenkalk-Formation (ki1-ki3)
	Impressamergel- und Wohlgeschichtete Kalk-Formation (ox1-ox2)
	Kandern-, Korallenkalk- und Nerineenkalk-Formation (jo)
	Mitteljura, ungliedert (jm)
	Wedelsandstein- bis Ornatenton-Formation (bj1-cl)
	Eisensandstein-Formation (aiZE)
	Opalinuston-Formation (al1)
	Unterjura, ungliedert (ju)
	Trias und Jura in Störungszonen, ungliedert (tr-j)
	Oberkeuper (z. T. mit Unterjura) (ko)
	Mittelkeuper, ungliedert (km)
	Kieselsandstein, Ob. Bunte Mergel, Stubensandstein- u. Knollenmergel-Formation (km3s-km5)
	Untere Bunte Mergel (km3u)
	Gipskeuper-, Schiffsandstein- und Bunte Mergel-Formation (km1-km3)
	Schiffsandstein-Formation (km2)
	Gipskeuper-Formation (km1)
	Unterkeuper (ku)
	Muschelkalk, ungliedert (m)
	Oberer Muschelkalk (mo)
	Mittlerer und Oberer Muschelkalk, ungliedert (mm-mo)
	Mittlerer Muschelkalk (mm)
	Unterer Muschelkalk (mu)
	Oberer Buntsandstein (so)
	Mittlerer Buntsandstein (linksrhein. z. T. mit Unt. Buntsandstein) (sm)
	Zechstein bis Mittlerer Buntsandstein (z-sm)
	Zechstein bis Unterer Buntsandstein (z-su)
	Zechstein (z)
	Rotliegend, ungliedert (r)
	Oberrotliegend (ro)
	Unterrotliegend (ru)
	Oberkarbon, ungliedert (oo)
	Stefan-Schichten (cst)
	Konglomerat-Formation (cK)
	Protocanitengrauwacken-Formation und Vulkanit-Komplex (cdP-cVK)
	Rotliegend-Quarzporphyr (rQ)
	Dunkler Gangmagmatit (GGd)
	Heller Gangmagmatit (GGh)
	Granitplutone (GRP)
	Granodiorit (GD)
	Randgranit (gRA)
	Weschnitz-Pluton (GoWP)
	Erzenbach-Komplex (axE)
	Diorit-Gabbro-Komplex (GDG)
	Metamorphite im Odenwald, Taunus und Soonwald (ms')
	Wiese-Wehra-Formation (diW)
	Badenweiler-Lenzkirch-Schiefer-Gruppe (aBL)
	Baden-Baden-Schiefer-Gruppe (aBB)
	Spießhorn-Parametamorphite und Schlächtenhaus-Schiefer-Formation (gSP-aS)
	Leukokrater Gneis (überwiegend) (gl')
	Flasergneis (überwiegend) (gf')
	Paragneis (überwiegend) (pg')
	Migmatit-Komplex (MI)
	Amphibolit (am)
	Tektonizone (TZ)